

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENT·E·S

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Pr**VERMOX**[®]

Comprimés de mébendazole, norme interne

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre ou recevoir **Vermox** et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement, et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur **Vermox** sont disponibles.

Pourquoi Vermox est-il utilisé?

Vermox est utilisé pour traiter les infestations dues à un ou plusieurs des vers parasites suivants :

- oxyure;
- ver rond;
- trichocéphale;
- ankylostome;
- anguillule;
- gros ver solitaire.

Comment Vermox agit-il?

Vermox empêche les vers parasites d'utiliser le sucre dont ils ont besoin pour survivre, ce qui les tue.

Quels sont les ingrédients de Vermox?

L'ingrédient médicamenteux est le mébendazole.

Les ingrédients non médicinaux sont les suivants : silice colloïdale anhydre, huile de coton hydrogénée, stéarate de magnésium, amidon de maïs, cellulose microcristalline, arôme d'orange, jaune orangé S (E110), saccharine sodique, laurylsulfate de sodium, glycolate d'amidon sodique et talc.

Vermox se présente sous la forme pharmaceutique suivante :

Comprimés à 100 mg

N'utilisez pas Vermox dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique au mébendazole;
- si vous êtes allergique à tout autre ingrédient non médicamenteux de Vermox.

Vermox ne doit pas être donné aux enfants de moins de 1 an.

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser Vermox, afin d'assurer l'utilisation adéquate du médicament et d'aider à éviter les effets secondaires. Informez

votre professionnel de la santé de votre état actuel et de vos problèmes de santé, notamment :

- si vous avez des troubles de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse;
- si vous êtes enceinte, pensez l'être ou avez l'intention de le devenir;
- si vous allaitez ou pensez le faire;
- si vous prenez de la cimétidine (un médicament utilisé pour traiter les brûlures d'estomac et d'autres problèmes qui entraînent trop d'acidité dans l'estomac);
- si vous prenez du métronidazole (un antibiotique utilisé pour traiter diverses infections).

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous utilisez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.

Les produits suivants pourraient interagir avec Vermox :

- la cimétidine, un médicament utilisé pour traiter les brûlures d'estomac et d'autres problèmes qui entraînent trop d'acidité dans l'estomac. Votre professionnel de la santé devra peut-être modifier votre dose de Vermox;
- le métronidazole, un antibiotique utilisé pour traiter diverses infections. Vermox ne doit pas être pris avec du métronidazole.

Comment utiliser Vermox?

- Prenez toujours Vermox exactement comme votre professionnel de la santé vous l'a indiqué.
- Avalez les comprimés entiers avec de l'eau. Les comprimés peuvent aussi être croqués.
- Pour les enfants de 1 à 6 ans ayant de la difficulté à avaler des comprimés, vous pouvez écraser le comprimé avant de le donner.
- Vous pouvez prendre Vermox avec ou sans aliments.
- La quantité de Vermox que vous prenez dépendra du type de ver responsable de l'infestation.
- En cas de doute concernant la façon de prendre Vermox, consultez votre professionnel de la santé.

Dose habituelle

(Adultes, adolescents et enfants de plus de 2 ans)

Infestation par des oxyures : Prendre 1 comprimé en dose unique. Après 2 et 4 semaines, prendre à nouveau 1 comprimé. Ceci est nécessaire pour se débarrasser complètement de l'infestation.

Infestation par ver rond, trichocéphale, ankylostome, anguillule, gros ver solitaire ou par plusieurs espèces de ver à la fois : Prendre 1 comprimé 2 fois par jour (le matin et le soir) pendant 3 jours de suite.

Surdose

Si vous avez pris trop de Vermox, vous pourriez présenter des crampes d'estomac, des nausées, des vomissements ou de la diarrhée.

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez pris ou reçu une trop grande quantité de Vermox, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Vermox?

Lorsque vous prenez Vermox, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Les effets indésirables peuvent comprendre les suivants :

- étourdissements
- douleur d'estomac, gaz intestinaux, douleur abdominale, diarrhée, nausées et vomissements
- éruptions cutanées
- urticaire
- perte de cheveux, permanente dans certains cas
- somnolence
- démangeaisons
- maux de tête

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez un professionnel de la santé.		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux.
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
TRÈS RARE			
Problèmes de foie : douleur abdominale haute, nausées ou perte d'appétit, fatigue extrême, fièvre, urine foncée, jaunissement de la peau et du blanc des yeux		✓	
Neutropénie (diminution du nombre de globules blancs) : infections, fatigue, fièvre, courbatures, douleurs et symptômes ressemblant à ceux de la grippe, mal de gorge, ganglions lymphatiques enflés, ulcères dans la bouche ou autour de l'anus		✓	
Agranulocytose (diminution importante du nombre de globules blancs) : fièvre, fatigue, respiration plus rapide, étourdissements, augmentation de la fréquence cardiaque, mal de gorge		✓	

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez un professionnel de la santé.		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux.
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
Glomérulonéphrite (maladie des reins) : gonflement, sang dans l'urine, quantité d'urine éliminée moins importante que d'habitude, besoin d'uriner la nuit, manque d'appétit, nausées, vomissements, fatigue		✓	
Réaction allergique : bouche, gorge et extrémités enflées, difficulté à respirer, essoufflement, éruptions cutanées, démangeaisons, urticaire, bouffées de chaleur ou évanouissement		✓	
Convulsions (manifestations épileptiques) : mouvements saccadés et incontrôlables des bras et des jambes, perte de conscience, tremblements incontrôlables		✓	
Nécrolyse épidermique toxique (réaction cutanée grave) : douleur cutanée généralisée, éruptions cutanées généralisées, cloques et larges zones de desquamation (peau qui pèle)		✓	
Syndrome de Stevens-Johnson (éruptions cutanées graves) : rougeurs, cloques et/ou desquamation de la peau et/ou de l'intérieur des lèvres, ainsi que des yeux, de la bouche, des voies nasales ou des organes génitaux, accompagnées de fièvre, de frissons, de maux de tête, de toux, de courbatures ou de glandes enflées		✓	
Œdème de Quincke (gonflement des tissus sous la peau) : gonflement du visage, des yeux, des lèvres, de la langue, de la gorge ou œdème		✓	

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez un professionnel de la santé.		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux.
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
des voies respiratoires pouvant nuire à la respiration et à la parole, gonflement des mains ou des pieds, étourdissements, nausées, vomissements			
FRÉQUENCE INCONNUE			
Résultats anormaux aux examens de la fonction hépatique (fonction du foie) : fatigue extrême, urine foncée, douleur abdominale		✓	
Résultats anormaux aux examens de la fonction rénale : fatigue extrême, gonflement, changements dans les habitudes urinaires, jaunissement de la peau et du blanc des yeux		✓	
Hématurie (sang dans l'urine) : urine de couleur rouge ou brunâtre, présence de caillots sanguins dans l'urine, besoin fréquent d'uriner ou douleur au moment d'uriner		✓	
Cylindrurie (présence de cylindres dans l'urine) : urine de couleur blanc laiteux, douleur au moment d'uriner, douleur à l'aîne, perte de poids		✓	

Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. Parlez à votre professionnel de la santé de tout effet inattendu qui survient durant la prise de Vermox, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit de santé à Santé Canada

- en visitant le site Web de déclaration des effets indésirables (www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur;

ou

- en téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation

Conservez le médicament à la température ambiante (entre 15 et 30 °C) et protégez-le de la lumière.

Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

Pour en savoir plus sur Vermox :

- Parlez-en à votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patient·e·s. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html), le site Web du fabricant (www.janssen.com/canada), ou peut être obtenu en téléphonant au 1-800-567-3331 ou au 1-800-387-8781.

Le présent feuillet a été rédigé par Janssen Inc.
Toronto (Ontario) M3C 1L9

Dernière révision : 16 août 2024